

TNM KLINICKÁ KLASIFIKACE

T – Primární nádor

TX	primární nádor nelze hodnotit
T0	bez známek primárního nádoru
Tis	karcinom <i>in situ</i> : intraepiteliální nádor bez invaze do lamina propria
T1	nádor postihuje lamina propria nebo submukózu
T2	nádor postihuje muscularis propria nebo subserózu ¹⁾
T3	nádor se šíří na serózu (viscerální peritoneum) bez invaze do okol. struktur ^{1, 2, 3)}
T4	nádor se šíří do okolních struktur ^{1, 2, 3)}

Pozn.: 1) Nádor se může šířit přes muscularis propria do vazů gastrokolických nebo gastrohepatických nebo do velkého nebo malého omenta bez penetrace viscerálního peritonea, které kryje tyto struktury. V tomto případě je nádor klasifikován jako T2.

2) Pokud nastane perforace viscerálního peritonea kryjícího gastrické vazy nebo omentum (malé i velké), pak je nádor klasifikován jako T3

3) Okolními strukturami žaludku jsou slezina, příčný tračník, játra, bránice, pankreas, stěna břišní, nadledvina, ledvina, tenké střevo a retroperitoneum.

Intramurální šíření do duodena a jícnu je klasifikováno největší hloubkou invaze v těchto orgánech nebo v žaludku.

N – Regionální mízní uzliny

NX	regionální mízní uzliny nelze hodnotit
N0	v regionálních mízních uzlinách nejsou metastázy
N1	metastázy v 1 až 6 regionálních mízních uzlinách
N2	metastázy v 7 až 15 regionálních mízních uzlinách
N3	metastázy ve více než 15 regionálních mízních uzlinách

M – Vzdálené metastázy

MX	vzdálené metastázy nelze hodnotit
M0	nejsou vzdálené metastázy
M1	vzdálené metastázy

ROZDĚLENÍ DO STADIÍ

Stadium 0	Tis N0 M0
Stadium IA	T1 N0 M0
Stadium IB	T1 N1 M0
	T2 N0 M0
Stadium II	T1 N2 M0
	T2 N1 M0
	T3 N0 M0
Stadium IIIA	T2 N2 M0
	T3 N1 M0
	T4 N0 M0
Stadium IIIB	T3 N2 M0
Stadium IV	T4 N1, N2, N3 M0
	T1, T2, T3 N3 M0
	jakékoliv T jakékoliv N M1