

TNM klasifikace

T – Primární nádor	
TX	primární nádor nelze hodnotit, nebo nádor prokázán pouze na základě přítomnosti maligní buňky ve sputu nebo bronchiálním výplachu, ale není viditelný rentgenologicky ani bronchoskopicky
T0	bez známek primárního nádoru
Tis	karcinom <i>in situ</i>
T1	nádor 3 cm nebo méně v největším rozměru, obklopený plící nebo viscerální pleurou, bez bronchoskopických známek poškození proximálně od lobárního bronchu (ne na hlavní bronchus) ¹⁾
T2	nádor s některou z následujících velikostí či šířením:
	<i>větší než 3 cm v největším rozměru</i>
	<i>postihuje hlavní bronchus, ve vzdálenosti 2 cm a distálně od kariny</i>
	<i>šíří se na viscerální pleuru</i>
	<i>je spojen s atelektázou nebo obstrukčním zánětem, který se šíří až k oblasti hilu, ale nepostihuje celou plíci</i>
T3	nádor jakékoliv velikosti, který se šíří přímo do některé z následujících struktur: hrudní stěna (včetně nádorů horního sulku), bránice, mediastinální pleura, parietální perikard; nebo nádor v hlavním bronchu ve vzdálenosti méně než 2 cm od kariny ¹⁾ , ale bez poškození kariny; nebo spojen s atelektázou nebo obstrukčním zánětem celé plíce
T4	nádor jakékoliv velikosti, který se šíří do některé z následujících struktur: mediastinum, srdce, velké cévy, trachea, jícen, těla obratlů, karina; samostatný nádorový uzel (uzly) ve stejném laloku, nádor s maligním pleurálním výpotkem ²⁾

Poznámky: 1) Neobvyklý povrchově se šířící nádor jakékoliv velikosti s invazivní komponentou ohraničenou na bronchiální stěnu, jež se může šířit proximálně k hlavnímu bronchu, je rovněž klasifikován jako T1.

2) Většina pleurálních výpotků u karcinomu plic je způsobena nádorem. Existují však ojediněle nemocní, u kterých je opakované cytologické vyšetření pleurální tekutiny negativní, výpotek není hemoragický ani nemá charakter exsudátu. Kde tyto nálezy a klinické zhodnocení ukazují na to, že výpotek nesouvisí s nádorem, tam by výpotek měl být vyloučen z kritérií pro určení stadia a nádor by měl být klasifikován jako T1, T2 nebo T3.

N – Regionální mízní uzliny	
NX	regionální mízní uzliny nelze hodnotit
N0	v regionálních mízních uzlinách nejsou metastázy
N1	metastázy ve stejnostranných peribronchiálních a/nebo stejnostranných hilových uzlinách, intrapulmonálních uzlinách včetně poškození přímým šířením
N2	metastázy ve stejnostranné mediastinální a/nebo subkarinální mízní uzlině (uzlinách)
N3	metastázy v druhostranných mediastinálních, druhostranných hilových, stejnostranných či druhostranných skalenických nebo supraklavikulárních mízních uzlinách
M – Vzdálené metastázy	
MX	vzdálené metastázy nelze hodnotit
M0	nejsou vzdálené metastázy
M1	vzdálené metastázy, včetně samostatného nádorového uzlu(ů) v různých lalocích (stejnostranných nebo druhostranných)

Rozdělení podle stádií

Okultní karcinom	TX N0 M0
Stadium 0	Tis N0 M0
Stadium IA	T1 N0 M0
Stadium IB	T2 N0 M0
Stadium IIA	T1 N1 M0
Stadium IIB	T2 N1 M0
	T3 N0 M0
Stadium IIIA	T1 N2 M0
	T2 N2 M0
	T3 N1,N2 M0
Stadium IIIB	jakékoliv T N3 M0
	T4 jakékoliv N M0
Stadium IV	jakékoliv T jakékoliv N M1