

## TNM klasifikace

| T – Primární nádor |             |                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TNM kategorie      | FIGO stadia |                                                                                                                                                       |
| TX                 |             | primární nádor nelze hodnotit                                                                                                                         |
| T0                 |             | bez známek primárního nádoru                                                                                                                          |
| Tis                | 0           | karcinom <i>in situ</i> (preinvazivní karcinom)                                                                                                       |
| T1                 | I           | karcinom čípku ohraničený na dělohu (šíření na tělo děložní se nezohledňuje)                                                                          |
| T1a                | IA          | invazivní karcinom diagnostikovaný pouze mikroskopicky. Všechny makroskopicky viditelné léze – byť jen se superficiální invazí – jsou T1 b/stadium IB |
| T1a1               | IA1         | stromální invaze ne větší než 3 mm do hloubky a horizontální šíření 7 mm nebo méně                                                                    |
| T1a2               | IA2         | stromální invaze více než 3 mm, ale ne více než 5 mm s horizontálním šířením 7 mm nebo méně                                                           |

Pozn: Hloubka invaze by neměla být více než 5 mm od baze epitelu, buď povrchového či žlazového, ze kterých vznikl. Hloubka invaze se definuje jako vzdálenost nádoru od epitelu–stromální hranice od přiléhající epiteliální papily, která je nejbližší povrchu, k nejhlubšímu místu invaze. Postižení lymfatických cév nemá vliv na klasifikaci

|      |      |                                                                                                                              |
|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T1b  | IB   | klinicky viditelná léze omezená na čípek nebo mikroskopická léze větší než T1a2/IA2                                          |
| T1b1 | IB1  | klinicky zřetelná léze 4 cm nebo méně v největším rozměru                                                                    |
| T1b2 | IB2  | klinicky zřetelná léze větší než 4 cm v největším rozměru                                                                    |
| T2   | II   | karcinom čípku se šíří mimo dělohu, ale ne až ke stěně pánevní a ne do dolní třetiny pochvy                                  |
| T2a  | IIA  | bez šíření do parametrií                                                                                                     |
| T2b  | IIB  | se šířením do parametria                                                                                                     |
| T3   | III  | nádor čípku se šíří ke stěně pánevní a/nebo se šíří na dolní třetinu pochvy a/nebo způsobuje hydronefrózu či afunkci ledviny |
| T3a  | IIIA | nádor postihuje dolní třetinu pochvy, bez šíření ke stěně pánevní                                                            |
| T3b  | IIIB | nádor se šíří ke stěně pánevní a/nebo způsobuje hydronefrózu či afunkci ledviny                                              |
| T4   | IVA  | nádor postihuje sliznici močového měchýře nebo rekta a/nebo se šíří mimo malou pánev                                         |

Pozn: Přítomnost bulózního edému nepostačí ke klasifikaci nádoru jako T4.

|    |     |                    |
|----|-----|--------------------|
| M1 | IVB | vzdálené metastázy |
|----|-----|--------------------|

## N – Regionální mízní uzliny

|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| NX | regionální mízní uzliny nelze hodnotit           |
| N0 | v regionálních mízních uzlinách nejsou metastázy |
| N1 | metastázy v regionálních mízních uzlinách        |

## M – Vzdálené metastázy

|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| MX | vzdálené metastázy nelze hodnotit |
| M0 | nejsou vzdálené metastázy         |
| M1 | vzdálené metastázy                |

## Rozdělení podle stádií

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Stadium 0    | Tis N0 M0                  |
| Stadium IA   | T1a N0 M0                  |
| Stadium IA1  | T1a1 N0 M0                 |
| Stadium IA2  | T1a2 N0 M0                 |
| Stadium IB   | T1b N0 M0                  |
| Stadium IB1  | T1b1 N0 M0                 |
| Stadium IB2  | T1b2 N0 M0                 |
| Stadium IIA  | T2a N0 M0                  |
| Stadium IIB  | T2b N0 M0                  |
| Stadium IIIA | T3a N0 M0                  |
| Stadium IIIB | T1 N1 M0                   |
|              | T2 N1 M0                   |
|              | T3a N1 M0                  |
|              | T3b jakékoliv N M0         |
| Stadium IVA  | T4 jakékoliv N M0          |
| Stadium IVB  | jakékoliv T jakékoliv N M1 |