

TNM klasifikace

T – Primární nádor	
TX	primární nádor nelze hodnotit
T0	bez známek primárního nádoru
T1	nádor nezjistitelný klinicky, palpačně, ani zobrazovacími vyšetřovacími metodami
T1a	nádor zjištěn náhodně histologicky v 5 % nebo méně resekované tkáně
T1b	nádor zjištěn náhodně histologicky ve více než 5 % resekované tkáně
T1c	nádor zjištěn při punkční biopsii (např.: při zvýšeném PSA)
T2	nádor omezen na prostatu ¹⁾
T2a	nádor infiltruje jeden lalok
T2b	nádor infiltruje oba laloky
T3	nádor se šíří přes pouzdro prostaty ²⁾ I
T3a	extrakapsulární šíření jednostranné nebo oboustranné
T3b	nádor infiltruje semenný váček(y)
T4	nádor je fixován nebo se šíří do okolních struktur (mimo semenné váčky): hrdla měchýře, zevního sfinkteru, rekta, levátorů a/nebo stěny pánevní

Pozn.: 1) Nádor nalezený při punkční biopsii v jednom či obou lalocích, avšak nezjistitelný palpačně, ani zobrazovacími vyšetřovacími metodami, je klasifikován T1c.

2) Invasze do apexu prostaty nebo do pouzdra (ale ne skrz) se neklasifikuje jako T3, ale T2.

N – Regionální mízní uzliny	
NX	regionální mízní uzliny nelze hodnotit
N0	v regionálních mízních uzlinách nejsou metastázy
N1	metastázy v regionálních mízních uzlinách

M – Vzdálené metastázy	
MX	vzdálené metastázy nelze hodnotit
M0	nejsou vzdálené metastázy
M1	vzdálené metastázy
M1a	mízní uzliny mimo regionální
M1b	kosti
M1c	jiné lokalizace

Pozn: Je-li postiženo více lokalizací, klasifikuje se nejpokročilejší kategorie

Rozdělení podle stádií

Stadium I	T1a N0 M0 G1
	T1a N0 M0 G2, G3–4
	T1b N0 M0 jakékoliv G
Stadium II	T1c N0 M0 jakékoliv G
	T1 N0 M0 jakékoliv G
	T2 N0 M0 jakékoliv G
Stadium III	T3 N0 M0 jakékoliv G
Stadium IV	T4 N0 M0 jakékoliv G
	jakékoliv T N1 M0 jakékoliv G
	jakékoliv T jakékoliv N M1 jakékoliv G