

TNM klasifikace

T – Primární nádor

Přídavné označení (m) je možné připojit ke kategorii T tam, kde je nutné vyznačit mnohočetné nádory. Přídavné označení (is) lze připojit k jakémukoliv T, aby se vyznačila přítomnost přidruženého karcinomu in situ.

TX	primární nádor nelze hodnotit
T0	bez známek primárního nádoru
Ta	neinvazivní papilární karcinom
Tis	karcinom <i>in situ</i> ("plochý nádor")
T1	nádor se šíří do subepiteliální pojivové tkáně
T2	nádor se šíří do svalové vrstvy
T2a	nádor infiltruje povrchovou vrstvu svalovou (vnitřní polovinu)
T2b	nádor infiltruje hlubokou vrstvu svalovou (zevní polovinu)
T3	nádor infiltruje perivezikální tkáně
T3a	mikroskopicky
T3b	makroskopicky (extravezikální masy)
T4	nádor se šíří do okolních orgánů: prostaty, dělohy, pochvy, stěny pánevní nebo stěny břišní
T4a	nádor se šíří do prostaty nebo dělohy nebo pochvy
T4b	nádor infiltruje pánevní stěnu nebo břišní stěnu

N – Regionální mízní uzliny

NX	regionální mízní uzliny nelze hodnotit
N0	v regionálních mízních uzlinách nejsou metastázy
N1	metastáza v jedné mízní uzlině, 2 cm nebo menší v největším rozměru
N2	metastáza v jedné uzlině větší než 2 cm, ale ne větší než 5 cm v největším rozměru, nebo vícečetné metastázy v mízních uzlinách ne větší než 5 cm v největším rozměru
N3	metastáza v mízní uzlině větší než 5 cm v největším rozměru

M – Vzdálené metastázy

MX	vzdálené metastázy nelze hodnotit
M0	nejsou vzdálené metastázy
M1	vzdálené metastázy

Rozdělení podle stádií

Stadium 0a	Ta N0 M0
Stadium 0is	Tis N0 M0
Stadium I	T1 N0 M0
Stadium II	T2a N0 M0
	T2b N0 M0
Stadium III	T3a N0 M0
	T3b N0 M0
	T4a N0 M0
Stadium IV	T4b N0 M0
	jakékoliv T N1, N2, N3 M0
	jakékoliv T jakékoliv N M1